


REIVINDICACIONES

[Reivindicación 1] Un compuesto representado por la fórmula general (A), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



5 X es C o N, y cuando X es N, R₄ está ausente;


R₁, R₄, R₆ y R₇ se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, ciano, -C(O)-O-alquilo, fenilalcoxi, carboxilo, hidroximetilo, cicloalquilo, amida, amida sustituida con alquilo, Z-C(O)- y heteroarilo, Z se selecciona del grupo que consiste en alquilo y heterocicloalquilo y un sustituyente es hidroxilo;

10 R₂, R₃ y R₅ cada uno se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxi, ciano, halógeno, haloalquilo, amida, hidroxilo, alquilo sustituido con hidroxilo, carboxilo, amino, alquilo sustituido con amino, alquilcarbonilo y -(CH₂)_n-O-(CH₂)_n-fenilo y n = 1, 2 o 3;

R₈ y R₉ cada uno se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, halógeno, cicloalquilo, alquiltio, alcoxi, arilo y heteroarilo; y

15 R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ no son simultáneamente todos hidrógeno; o cuando R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ son simultáneamente todos hidrógeno, entonces R₈ y R₉ no son simultáneamente ambos hidrógeno.

[Reivindicación 2] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el
20 compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo es un compuesto representado por la fórmula general (A1), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



R₁, R₄, R₆ y R₇ se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, ciano, -C(O)-O-alquilo, fenilalcoxi, carboxilo, hidroximetilo, cicloalquilo, amida, amida sustituida con alquilo, Z-C(O)- y heteroarilo, Z se selecciona del grupo que consiste en alquilo y heterocicloalquilo y un sustituyente es hidroxilo;

R₂, R₃ y R₅ cada uno se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxi, ciano, halógeno, haloalquilo, amida, hidroxilo, alquilo sustituido con hidroxilo, carboxilo, amino, alquilo sustituido con amino, alquilcarbonilo y -(CH₂)_n-O-(CH₂)_n-fenilo y n = 1, 2 o 3;

R₈ y R₉ cada uno se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, halógeno, cicloalquilo, alquiltio, alcoxi, arilo y heteroarilo; y

R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ no son simultáneamente todos hidrógeno; o cuando R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ son simultáneamente todos hidrógeno, entonces R₈ y R₉ no son simultáneamente ambos hidrógeno.

[Reivindicación 3] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R₁, R₂, R₄, R₅, R₆ y R₇ son simultáneamente todos hidrógeno y R₃ se selecciona del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, ciano, halógeno, haloalquilo, amida, hidroxilo, alquilo sustituido con hidroxilo, carboxilo, amino, alquilo sustituido con amino, alquilcarbonilo y -(CH₂)_n-O-(CH₂)_n-fenilo y n = 1, 2 o 3; o

R₁, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ son simultáneamente todos hidrógeno y R₂ se selecciona del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, ciano, halógeno, haloalquilo, amida, hidroxilo, alquilo sustituido con hidroxilo, carboxilo, amino, alquilo sustituido con amino, alquilcarbonilo y -(CH₂)_n-O-(CH₂)_n-fenilo y n = 1, 2 o 3.

[Reivindicación 4] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que

el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo,




n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo; el haloalquilo se refiere a alquilo en el que uno o más hidrógenos se sustituyen por halógeno; el alquilo sustituido con

5 hidroxilo se refiere a alquilo en el que uno o más hidrógenos se sustituyen por hidroxilo; el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo; y




el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo; el heterocicloalquilo se refiere a cicloalquilo en el que uno o más átomos de carbono se reemplazan por heteroátomos, los heteroátomos se seleccionan del grupo

10 que consiste en N, O y S; el alcoxi se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi e isopropoxi.


[Reivindicación 5] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R_2 o R_3 se selecciona del grupo que consiste en F, Cl, Br, metilo, hidroxilo, hidroximetilo,

15 trifluorometilo, $-CF_2H$, $-C(O)NH_2$, $-NH_2$, ciano, $-COOH$, metoxi, $-CH_2-O-CH_2$ -fenilo, ,  y ; y/o

R_1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, hidroxilo, hidroximetilo, ciano, F, Cl, Br, $-O-CH_2$ -fenilo, $-COOH$, $-COOCH_2CH_3$, , , amida, formamida, $CH_3-C(O)-$,

,  y ; y/o

20 R_6 y R_7 son independientemente H o $-COOH$; y/o R_4 , R_6 y R_7 son independientemente H; y/o R_8 y R_9 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, cloro,

metilo, metoxi, metiltio, etilo, isopropilo, fenilo, ciclopropilo y .

[Reivindicación 6] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que el

25 compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente


aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto
A1		A5		A6	
A7		A8		A9	
A10		A11		A12	
A13		A14		A15	
A16		A17		A18	
A19		A20		A21	
A22		A23		A24	
A25		A26		A27	
A28		A29		A30	
A31		A32		A33	

A35		A36		A37	
A38		A39		A40	
A41		A42		A43	
A44		A45		A46	
A47		A48		A49	
A50		A51		A52	
A53		A54		A55	
A56		A57		A58	
A59		A60		A61	



A62		A63		A64	
A65		A66		A67	
A68		A69		A70	
A71		A72		A73	

[Reivindicación 7] Un compuesto representado por la fórmula general (B), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que





5

A se selecciona del grupo que consiste en



B se selecciona del grupo que consiste en





Q se selecciona del grupo que consiste en N y CR₄, R₄ se selecciona del grupo que consiste en H y halógeno;

T₁ y T₂ se seleccionan del grupo que consiste en N y CH;

5 X y Y se seleccionan independientemente del grupo que consiste en C(O), O, S, NH y CH₂,

Z está ausente, o Z se selecciona del grupo que consiste en C(O), O, S, NH y CH₂,

W se selecciona del grupo que consiste en C(O), O, S, NH y CH₂,

R₁ es hidrógeno o R₁ representa que el hidrógeno en un anillo se sustituye además por

10 alquilo, haloalquilo, carboxilo, alcoxi, haloalcoxi, ciano, halógeno o ; U₁, U₂ y U₄ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en CH y N; U₃ se selecciona del grupo que consiste en CH₂ y NH; y un número de R₁ es uno o más;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo y halógeno; y un número de R₂ es uno o más; y

15 R₃ es hidrógeno o R₃ representa que el hidrógeno en un anillo se sustituye además por alquilo, halógeno, oxo, fenilo sustituido o no sustituido, un sustituyente del fenilo sustituido se selecciona del grupo que consiste en alquilo y halógeno; y un número de R₃ es uno o más.


[Reivindicación 8] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 7, en el que


20 el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;

25 el alcoxi es alcoxi C₁₋₆, el alcoxi C₁₋₆ se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, isobutoxi, sec-butoxi, terc-butoxi, n-pentoxi, sec-pentoxi, 1-etilpropoxi, 2-metilbutoxi, terc-pentoxi, 1,2-dimetilpropoxi, isopentoxi, neopentoxi, n-hexoxi, isohexoxi, sec-hexoxi, terc-hexoxi, neohexoxi, 2-metilpentoxi, 1,2-dimetilbutoxi y 1-etilbutoxi; y el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo.




[Reivindicación 9] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 7, en el que Q es N; y/o Q es CH y R₂ es F; y/o T₁ es N.

[Reivindicación 10] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 7, en el que una


fracción  en la fórmula general (B) se selecciona del grupo que consiste en:









10  representa un sitio de conexión;


una fracción  en la fórmula general (B) se selecciona del grupo que consiste en:  y  y  representa un sitio de conexión.

[Reivindicación 11] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 7, en el que R₃ es

15 hidrógeno, metilo, F, fenilo o  y  representa un sitio de conexión; y/o

A se selecciona del grupo que consiste en  y ; y/o B se

selecciona del grupo que consiste en , , , ,




[Reivindicación 12] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente

5 aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Compuesto	No.	Compuesto	No.	Compuesto
B1		B2		B3	
B4		B5		B6	
B7		B8		B9	
B10		B11		B12	
B13		B14		B15	
B16		B17		B18	
B19		B20		B21	



B22		B23		B24	
B25		B26		B27	
B28		B29		B30	
B31		B32		B33	
B34					

[Reivindicación 13] Un compuesto representado por la fórmula general (C), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que








5

el anillo A se selecciona del grupo que consiste en



y X y Y juntos forman un anillo saturado o insaturado de 5 a 7 miembros, el anillo saturado o insaturado de 5 a 7 miembros comprende 0, 1, o 2 heteroátomos, los heteroátomos se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S; B se

selecciona del grupo que consiste en , , , ,




Q se selecciona del grupo que consiste en N y CR_{Q1}, R_{Q1} se selecciona del grupo que consiste en H y halógeno;


5 T₁ se selecciona del grupo que consiste en N y CH;



R₂ se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo y halógeno y, un número de R₂ es uno o más;

R₃ es hidrógeno o R₃ representa que el hidrógeno en el anillo A se sustituye además por oxo, alquilo, halógeno, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, o alquinilo; y un número de R₃ es uno o más, o R₃ adyacentes juntos forman un grupo alcoxi



R₄ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilo sustituido o no sustituido, ciano, -C(O)-O-alquilo, fenilalcoxi, carboxilo, hidroximetilo y cicloalquilo, un sustituyente se selecciona del grupo que consiste en hidroxilo,

15 amida, halógeno y  ; U₁, U₂ y U₄ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en CH y N; U₃ se selecciona del grupo que consiste en CH₂ y NH; y un número de R₄ es uno o más; y

cuando el anillo A es , el anillo B no es .

[Reivindicación 14] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 13, en el que

el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo,

terc-hexilo, neo-hexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;

el alcoxi se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, isobutoxi, sec-butoxi y terc-butoxi;

5 el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo; y
















el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo.

[Reivindicación 15] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 13, en el que Q es N; y/o Q es CH y R₂ es F; y/o T₁ es N; y/o






















10 R₃ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, metoxi, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, flúor, cloro, oxo y CHF₂-O-; y R₄ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, hidroxilo, hidroximetilo, ciano, F, Cl, Br, -O-CH₂-fenilo, -COOH,

-COOCH₂CH₃, , , amida, formamida, CH₃-C(O)-, etinilo, trifluorometilo, difluorometoxi y metoxi.


15 [Reivindicación 16] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 13, en el que el anillo

A se selecciona del grupo que consiste en , , , , , , , , , , , , ,  y ;

20 además, el anillo A sustituido con R₃ se selecciona del grupo que consiste en:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  y .

además, el anillo B sustituido con R₄ se selecciona del grupo que consiste en:



[Reivindicación 17] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 13, en el que el compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:


No.	Compuesto	No.	Compuesto	No.	Compuesto
C1		C2		C3	
C4		C5		C6	
C7		C8		C9	
C10		C11		C12	

C13		C15		C16	
C17		C18		C19	
C20		C21		C22	
C23		C24		C25	
C26		C27		C28	
C29		C30		C31	
C32		C33		C34	
C35		C36		C37	
C38		C39		C40	
C41		C42		C43	

C44		C45		C46	
C47		C48		C49	
C50		C51		C52	
C53		C54		C55	
C56		C57		C58	
C59		C60		C61	
C62		C63		C64	
C65		C66		C67	
C68		C69		C70	
C71		C72		C73	

C74		C75		C76	
C77		C78		C79	
C80		C81		C82	
C83		C84		C85	
C86		C87		C88	
C89		C90		C91	
C92		C93		C94	
C95					

[Reivindicación 18] Un compuesto representado por la fórmula general (D), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



5 R_1, R_2, R_3 y R_4 cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste en

hidrógeno, halógeno, alquilo, ciano, haloalquilo y cicloalquilo;

X se selecciona del grupo que consiste en CH y N, Z se selecciona del grupo que consiste en CH y N, y cuando Z es N, R₆ está ausente;

Y se selecciona del grupo que consiste en CH y N, y cuando Y es N, R₄ está ausente;

5 T se selecciona del grupo que consiste en CH, N y CT₁ y T₁ se selecciona del grupo que consiste en CN, alquilo y haloalquilo;

R₅ y R₆ cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo y cuando X es CH, R₅ y R₆ no son simultáneamente ambos hidrógeno, o cuando X es CH, R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ y R₆ son simultáneamente todos hidrógeno; y

10 R₇ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxi, ciano, alquinilo, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilsulfonilo, alquilsulfonilo, -N(C(O))_nX₁X₂ sustituido o no sustituido, -O-cicloalquilo sustituido o no sustituido, -O-heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, grupo ácido borónico y halógeno y X₁ y X₂ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en alquilo, o X₁ y X₂ juntos con el átomo de N al que están adheridos forman
15 un heterocicloalquilo, un sustituyente se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo y n = 0 o 1; y cuando R₇ se selecciona del grupo que consiste en alquilo, alcoxi y halógeno, R₅ y R₆ no son simultáneamente ambos hidrógeno, o X es N.

[Reivindicación 19] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 18, en el que

20 el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;

el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo;


25 el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo;

el heterocicloalquilo es cicloalquilo en el que uno o más átomos de carbono se reemplazan por heteroátomos, los heteroátomos se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S;

el alquinilo es alquinilo C₂₋₄, tal como etinilo, propinilo y butinilo.

30 [Reivindicación 20] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 18, en el que el haloalquilo es -CF₃.
















[Reivindicación 21] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 18, en el que el R₅ y R₆ cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, flúor y metilo; R₇ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, metoxi, etoxi, flúor, etinilo, cloro,



el R₁ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, ciclopropilo, ciano, metilo y -CF₃; R₂, R₃ y R₄ son cada uno independientemente hidrógeno; y/o


el X es N.

10 [Reivindicación 22] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 18, en el que el compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto
D1		D2		D3	
D4		D5		D6	
D7		D8		D9	
D10		D11		D12	
D13		14		D15	

D16		D17		D18	
D19		D20		D21	
D22		D23		D24	
D25		D26		D27	
D28		D29			

[Reivindicación 23] Un compuesto representado por la fórmula general (E), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



5 el anillo A se selecciona del grupo que consiste en benzofurano, benzotiazol, 1H-indol, indol, quinolina y una estructura en la que uno o más -C= o -CH- en un anillo de benzofurano, benzotiazol, 1H-indol, indol o quinolina se reemplaza por el átomo de N;

T se selecciona del grupo que consiste en N y CR₇; y

10 R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo y alcoxi y una sustitución se selecciona del grupo que consiste en halógeno y alquilo.

[Reivindicación 24] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 23, en el que

el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;


el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo;

el alcoxi se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, isobutoxi, sec-butoxi, terc-butoxi, n-pentoxi, sec-pentoxi, 1-etilpropoxi, 2-metilbutoxi, terc-pentoxi, 1,2-dimetilpropoxi, isopentoxi, neopentoxi, n-hexoxi, isohexoxi, sec-hexoxi, terc-hexoxi, neohexoxi, 2-metilpentoxi, 1,2-dimetilbutoxi, 1-etilbutoxi, n-heptoxi e isoheptoxi; y

el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo; el heterocicloalquilo se refiere a cicloalquilo en el que al menos un átomo de carbono se reemplaza por un heteroátomo, el heteroátomo se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre.

[Reivindicación 25] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 23, en el que T es de N; y/o R₁ y R₃ son hidrógeno y R₂ es -OCHF₂.

[Reivindicación 26] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 23, en el que el anillo




[Reivindicación 27] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 23, en el que el compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Compuesto	No.	Compuesto	No.	Compuesto
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------


E1		E2		E3	
E4		E5		E6	
E7		E8		E9	
E10		E11		E12	
E13		E14		E15	
E16		E17		E18	


[Reivindicación 28] Un compuesto representado por la fórmula general (F), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



5

el anillo A se selecciona del grupo que consiste en:





sustituidos con R_1 ; el anillo B se selecciona del grupo que consiste en



R_1 , R_{1a} , R_{1b} , R_{1c} , R_{1d} cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste

5 en hidrógeno, oxo, hidroxilo, alquino, alquilalquino, alquilalquilalquilo, alquilo, halógeno,

alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, ciano y




o dos sustituyentes adyacentes juntos forman un heterociclo saturado o insaturado de 5 a 6 miembros;

un número de R_2 es uno o más, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilo sustituido o no sustituido, ciano, $-C(O)-O$ -alquilo, fenilalcoxi, carboxilo, hidroximetilo y cicloalquilo, un sustituyente se

10 selecciona del grupo que consiste en hidroxilo, amida y halógeno;

Q , X , Y , Z cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste en CR_3 y N , R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, alquilo, halógeno, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo y ciano y



15 cuando A es , al menos dos de Q , X , Y , Z son N ;

T se selecciona cada uno independientemente del grupo que consiste en CH y N ; y

W_1 se selecciona del grupo que consiste en CH_2 y NH , y W_2 se selecciona cada uno independientemente del grupo que consiste en CH y N .

[Reivindicación 29] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal

20 farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 28, en el que




el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;


25 el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo;

el alcoxi se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, isobutoxi, sec-butoxi y terc-butoxi; el alquiltio se refiere a alcoxi en el que el átomo de oxígeno se reemplaza por un átomo de azufre; y el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo.

























- 5 [Reivindicación 30] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 28, en el que Q es N; y/o R₂ es -O-CHF₂.

[Reivindicación 31] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 28, en el que


- 10 el anillo A se selecciona del grupo que consiste en , , ,



el anillo A sustituido se selecciona del grupo que consiste en:


- , , ,
- , , , , , , , ,
- , , , , , , , ,
- , , ,  y .

o el anillo A se selecciona del grupo que consiste en
























y el anillo A

sustituido se selecciona del grupo que consiste en




[Reivindicación 32] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 28, en el que el compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto
F1		F2		F3	
F4		F5		F6	
F7		F8		F9	
F10		F11		F12	
F13		F14		F15	
F16		F17		F18	
F19		F20		F21	

F22		F23		F24	
F25		F26		F27	
F28		F29		F30	
F31		F32		F33	
F34		F35		F36	
F37					

[Reivindicación 33] Un compuesto representado por la fórmula general (G), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



5 X se selecciona del grupo que consiste en un alquilo sustituido o no sustituido, amino, O y S, y un sustituyente se selecciona del grupo que consiste en oxo, alquilo, halógeno, alcoxi, hidroxilo y alcoxicarbonilo;

el anillo A es heterociclo saturado o insaturado de 5 a 14 miembros sustituido o no sustituido con R₁ y el heterociclo puede ser monocíclico, bicíclico o tricíclico;

R₁ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, alquilo, halógeno, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo y ciano y m = 0, 1, 2 o 3;

5 B es el anillo B, que se selecciona del grupo que consiste en heterociclo saturado o insaturado de 5 a 7 miembros sustituido o no sustituido con R₂, alquilo sustituido con oxo y -C(O)-piridina;

R₂ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, tio, alquilo, halógeno, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, ciano y carboxilo y n = 0, 1, 2 o 3;

10 R₃ cada uno se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxi, ciano, halógeno, haloalquilo, amida, hidroxilo, alquilo sustituido con hidroxilo, carboxilo y amino, y p = 0, 1, 2 o 3.

[Reivindicación 34] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 33, en el que

15 el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;


20 el alcoxi se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, isobutoxi, sec-butoxi y terc-butoxi;


el alquiltio se selecciona del grupo que consiste en metiltio, etiltio, propiltio, isopropiltio, n-butiltio, isobutiltio, sec-butiltio y terc-butiltio;

el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo;


25 el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo.

[Reivindicación 35] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 33, en el que





el anillo B se selecciona del grupo que consiste en:



[Reivindicación 36] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 33, en el que R₁ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, ciano, metoxi, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, flúor, cloro y CHF₂-O-; y/o R₂ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, oxo y tio; y/o R₃ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, ciano, metoxi, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, flúor y cloro; y/o X se selecciona del grupo que







10

consiste en -CH₂-, -C(O)-, -CH(OH)-, -NH₂-, -NH(CH₃)-, , O y S.

[Reivindicación 37] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 33, en el que el


15

compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Compuesto	No.	Compuesto	No.	Compuesto
G1		G2		G3	
G4		G5		G6	

G7		G8		G9	
G10		G11		G12	
G13		G14		G15	
G16		G17		G18	
G19		G20		G21	

[Reivindicación 38] Un compuesto representado por la fórmula general (H), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



5 R_1 , R_2 , R_3 y R_4 cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, ciano, haloalquilo y cicloalquilo;


X se selecciona del grupo que consiste en C y N, y cuando X es N, R_5 está ausente;

Y se selecciona del grupo que consiste en C y N, y cuando Y es N, R_6 está ausente;

Z se selecciona del grupo que consiste en C y N, y cuando Z es N, R_7 está ausente;

R₅, R₆ y R₇ cada uno se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo;

un número de R₈ es uno o más, que se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, fenilo, alquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilalquilo sustituido o no sustituido y cicloalquilo sustituido o no sustituido, un sustituyente se selecciona del grupo que consiste en alquilo y halógeno; y

el anillo A se selecciona del grupo que consiste en , , y cuando A es , y X, Y, y Z son todos C, R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ y R₇ no son simultáneamente todos hidrógeno.

[Reivindicación 39] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 38, en el que

el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;


el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo;


el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo.


[Reivindicación 40] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 38, en el que R₁ se selecciona del grupo que consiste en halógeno y alquilo; y/o Y es N, o Y es C y R₅ se selecciona del grupo que consiste en halógeno y alquilo; y/o R₈ se selecciona del grupo que consiste en

metilo, ciclopropilo, ciclobutilo,  y/o Z es de N.

[Reivindicación 41] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal

farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 38, en el que el 

se selecciona del grupo que consiste en ,




[Reivindicación 42] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 38, en el que el

5 compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto	No.	Estructura del Compuesto
H1		H2		H3	
H4		H5		H6	
H7		H8		H9	
H10		H11		H12	
H13		H14			

[Reivindicación 43] Un compuesto representado por la fórmula general (J), o un isómero del mismo o un racemato del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que



el anillo A es heterociclo saturado o insaturado de 5 a 14 miembros sustituido o no sustituido con R_1 y el heterociclo puede ser monocíclico, bicíclico o tricíclico;

R_1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, alquilo, halógeno, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo y ciano y $m = 0, 1, 2$ o 3 ;

el anillo B se selecciona del grupo que consiste en un anillo monocíclico y bicíclico saturado o insaturado de 5 a 8 miembros, y no es  ;

R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, tio, alquilo, halógeno, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalquilalquilo y ciano y $n = 0, 1, 2$ o 3 ;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, ciano, $-C(O)-O$ -alquilo, fenilalcoxi, carboxilo, hidroximetilo, cicloalquilo, alquilo, amida, amida sustituida con alquilo, $Z-C(O)-$, arilo y heteroarilo, Z se selecciona del grupo que consiste en alquilo y heterocicloalquilo, un sustituyente es hidroxilo y $p = 0, 1, 2$ o 3 ; y

T_1 , T_2 y T_3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en CH y N.

[Reivindicación 44] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 43, en el que

el alquilo se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, sec-pentilo, 1-etilpropilo, 2-metilbutilo, terc-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, isopentilo, neopentilo, n-hexilo, isohexilo, sec-hexilo, terc-hexilo, neohexilo, 2-metilpentilo, 1,2-dimetilbutilo y 1-etilbutilo;

el alcoxi se selecciona del grupo que consiste en metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, isobutoxi, sec-butoxi y terc-butoxi;

el alquiltio se selecciona del grupo que consiste en metiltio, etiltio, propiltio, isopropiltio, n-butiltio, isobutiltio, sec-butiltio y terc-butiltio;


el cicloalquilo se selecciona del grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo; y

el halógeno se selecciona del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y yodo.

[Reivindicación 45] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal

5 farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 43, en el que


el anillo A se selecciona del grupo que consiste en



[Reivindicación 46] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 43, en el que

el anillo B se selecciona de , , , , , y ; y/o R₁ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, ciano, metoxi, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, flúor, cloro y CHF₂-O-; y/o R₂ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, ciano, metoxi, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, flúor y cloro; y/o el anillo B se

conecta de la siguiente manera:



[Reivindicación 47] El compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal

20 farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 43, en el que el compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal farmacéuticamente

aceptable del mismo se selecciona del grupo que consiste en:

No.	Compuesto	No.	Compuesto	No.	Compuesto
J1		J2		J3	
J4		J5		J6	
J7		J8		J9	

[Reivindicación 48] Una composición farmacéutica, que comprende una cantidad

terapéuticamente eficaz del compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o la sal

5 farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1

a 47, y un portador farmacéuticamente aceptable.

[Reivindicación 49] Uso del compuesto o el isómero del mismo o el racemato del mismo o

la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 47 en la fabricación de un medicamento para tratar una enfermedad

10 relacionada con el inhibidor de PCSK9; preferiblemente, la enfermedad relacionada con el

inhibidor de PCSK9 comprende hipercolesterolemia.