

REIVINDICACIONES

1. Una composición química que comprende ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas, en donde el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas se encuentran presentes en la composición química en una proporción aproximada de 1:2.

2. La composición química de la reivindicación 1, en donde el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas se encuentran presentes en la composición química en una proporción de entre 1:1.9 y 1:2.1.

3. La composición química de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, que además comprende un anestésico local.

4. La composición química de la reivindicación 3, en donde el anestésico local comprende menos del 1% de la composición química sobre una base de peso/peso.

5. La composición química de cualquiera de las reivindicaciones 3 y 4, en donde el anestésico local se selecciona del grupo que consiste de lidocaína y xilocaína.

6. Un método para formar la composición química de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, comprendiendo el método:

recolectar un volumen de sangre que comprenda plasma, plaquetas y eritrocitos de un individuo;

separar el plasma y las plaquetas de los eritrocitos, formando así un plasma rico en plaquetas;

recolectar el plasma rico en plaquetas; y
mezclar el plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico, formando así la composición química.

7. El método de la reivindicación 6, en donde el volumen de sangre se recolecta de una o más de: la vena cefálica del individuo, la vena basílica del individuo y la vena cubital mediana del individuo.

8. El método de cualquiera de las reivindicaciones 6 y 7, en donde el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico se mezclan en una proporción de entre 1:1.9 y 1:2.1.

9. El método de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en donde el plasma rico en plaquetas se recolecta utilizando un equipo WorldPRP™.

10. El método de la reivindicación 9, en donde el equipo es un equipo con forma de reloj de arena.

5 11. Un método para aumentar el tamaño del pene de un individuo, comprendiendo el método la inyección de un volumen de la composición química como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en la diáfisis del pene.

10 12. El método de la reivindicación 11, en donde la inyección del volumen de la composición química en la diáfisis del pene consiste en inyectar una primera porción del volumen de la composición química en la cara dorsal de la cara dorsal de la diáfisis del pene, cerca de la base del pene.

15 13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 11 y 12, en donde la inyección del volumen de la composición química en la diáfisis del pene consiste en inyectar una segunda porción del volumen de la composición química y una tercera porción del volumen de la composición química en la diáfisis del pene, en lados opuestos del hilio del pene.

20 14. El método de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, en donde la inyección del volumen de la composición química en la diáfisis del pene comprende inyectar una cuarta porción del volumen de la composición química en la cara dorsal de la diáfisis del pene, generalmente a medio camino entre la base del pene y la punta del pene, en donde la punta del pene se opone a la base del pene.

25 15. El método de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, en donde la inyección del volumen de la composición química en la diáfisis del pene comprende inyectar la composición química entre la piel del pene y el cuerpo cavernoso de la diáfisis del pene.

30 16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 15, que comprende además masajear la diáfisis del pene, distribuyendo así el volumen de la composición química inyectada en la diáfisis del pene alrededor y a lo largo de la diáfisis del pene.

17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 16, que comprende además la inyección de un volumen de ácido hialurónico en el glande del pene.

18. El método de la reivindicación 17, en donde la inyección del
5 volumen de ácido hialurónico en el glande consiste en inyectar la corona del glande con múltiples inyecciones de ácido hialurónico, separadas circunferencialmente alrededor del glande.

19. El método de cualquiera de las reivindicaciones 17 y 18, en donde el volumen de la composición química inyectada en el pene es de
10 entre 70 y 72 mililitros, y el volumen de ácido hialurónico inyectado en el glande es de entre 9 y 10 mililitros.

20. Un método para aumentar el tamaño del pene de un individuo, comprendiendo el método:

15 formar la composición química de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, en donde se extrae un volumen de sangre del individuo;

inyectar una primera porción de la composición química en la cara dorsal de la diáfisis del pene, cerca de la base del pene;

20 inyectar una segunda porción de la composición química y una tercera porción de la composición química en la diáfisis del pene, en lados opuestos del hilio del pene;

25 inyectar una cuarta porción de la composición química en la cara dorsal de la diáfisis del pene, generalmente a medio camino entre la base del pene y la punta del pene, en donde la punta del pene se opone a la base del pene;

masajear la diáfisis del pene para distribuir así la primera, la segunda, la tercera y la cuarta porciones de la composición química inyectadas en la diáfisis del pene alrededor y a lo largo de la diáfisis del pene; e

30 inyectar la corona del glande del pene con múltiples inyecciones de ácido hialurónico separadas circunferencialmente alrededor del glande;

en donde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta porciones de la composición química inyectada en la diáfisis del pene en conjunto equivalen a entre 70 y 72 mililitros de la composición química, y el volumen de ácido hialurónico inyectado en la corona del glande del pene es de entre 9 y 10 mililitros.

5