


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto representado por la Fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este; en donde:

R¹ es fenilo sustituido por (i) apariciones de ciano y m de R⁴, y (ii) alcoxilo C₁₋₄ o haloalcoxilo C₁₋₄;

R² representa de forma independiente para cada aparición de alquilo C₁₋₄;

R³ es hidrógeno o alquilo C₁₋₄;


R⁴ es alquilo C₁₋₄;

R⁵ representa de forma independiente para cada aparición de alquilo C₁₋₄ o halógeno;

A¹ es un pirimidinileno, piridazinileno, pirazinileno, piridinileno o fenileno, cada uno de los cuales está sustituido con n apariciones de R⁵;

L es un enlazador; y

A² es uno de los siguientes:



B¹ es (i) ciclobutileno sustituido por 1, 2, 3 o 4 apariciones de R² o (ii) ciclohexileno sustituido por 0, 1 o 2 apariciones de R²;

R^{1A} es alquilo C₁₋₄ o cicloalquilo C₃₋₄;

R^{2A} representa de forma independiente para cada aparición de alquilo C₁₋₄ o cicloalquilo C₃₋₄;

R^{3A} es hidrógeno, halo, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄ o alcoxilo C₁₋₄;

R^{4A} es -(alquilenos C₀₋₆)-(heteroarilo de 5-6 miembros que contiene 1, 2 o 3

heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre), $-(\text{alquileo } C_{1-6})-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{5A})(\text{R}^{6A})$, $-(\text{alquileo } C_{1-6})-\text{N}(\text{R}^{5A})\text{C}(\text{O})\text{R}^{7A}$, $-(\text{alquileo } C_{1-6})-\text{CO}_2\text{R}^{7A}$, $-(\text{alquileo } C_{1-6})-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{7A}$, $-(\text{alquileo } C_{1-6})\text{-ciano}$, $-(\text{alquileo } C_{1-6})\text{-O}-(\text{alquilo } C_{1-6})$, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} o hidrógeno; o R^{4A} y R^{10A} junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo carbocíclico saturado C_{3-5} ;



R^{5A} y R^{6A} son independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-6} ; o R^{5A} y R^{6A} se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo de 3-7 miembros que contiene 1 átomo de nitrógeno;

R^{7A} es alquilo C_{1-6} , $-(\text{alquileo } C_{1-6})-(\text{cicloalquilo } C_{3-6})$, o cicloalquilo C_{3-6} ;

R^{10A} es hidrógeno o alquilo C_{1-4} ; y


m , n y p son independientemente 0, 1 o 2.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es fenilo sustituido por (i) apariciones de ciano y m de R^4 , y (ii) alcoxilo C_{1-4} .
3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es fenilo sustituido por (i) apariciones de ciano y m de R^4 , y (ii) haloalcoxilo C_{1-4} .





6. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde m es 0.
7. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^2 es alquilo C_{1-4} .
8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^2 es metilo.
9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde R^3 es hidrógeno.
10. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde B^1 es ciclobutileno sustituido por 1, 2, 3 o 4 apariciones de R^2 .


11. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde B¹ es ciclobuteno sustituido por 4 apariciones de R².
12. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde B¹ es ciclohexileno sustituido por 0, 1 o 2 apariciones de R².
13. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde B¹ es ciclohexileno.
14. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula I.
15. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ia o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




16. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ib o Ic, o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




17. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Id o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




18. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ie o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




19. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula If o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




20. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ig o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




21. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ih o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




22. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ii o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




23. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ij o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




24. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ik o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




25. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula II o Im, o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




26. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula In o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




27. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Io o Ip, o una sal farmacéuticamente aceptable de este:






(Ip).

28. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Iq o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




(Iq).

29. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de la Fórmula Ir o Is, o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




(Ir)



(Is).


30. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es piridazinileno sustituido por n apariciones de R^5 .

31. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es




32. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es pirimidinileno sustituido por n apariciones de R^5 .

33. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es




, donde ** es el punto de unión a L.

34. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es




35. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es pirazinileno sustituido por n apariciones de R^5 .

36. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es




37. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es piridinileno sustituido por n apariciones de R^5 .

38. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es



39. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es fenileno sustituido por n apariciones de R^5 .


40. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde A^1 es




41. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-30, 32, 35, 37 o 39, en donde n es 0.

42. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde R^{3A} es halo, alquilo C_{1-4} o alcoxi C_{1-4} .

43. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-42, en donde A^2 es



44. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es



45. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-43, en donde R^{4A} y R^{10A} , junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo carbocíclico saturado C_{3-5} .
46. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es - (alquileo C_{0-6})-(heteroarilo de 5-6 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre).
47. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es - (alquileo C_{1-2})-(heteroarilo de 5-6 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre).
48. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es - (alquileo C_{1-2})-(heteroarilo de 5 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre).
49. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es (alquileo C_{1-2})-(oxazolilo).
50. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es (alquileo C_{1-6})-O-(alquilo C_{1-6}).
51. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es (alquileo C_{1-2})-O-(alquilo C_{1-2}).
52. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es alquilo C_{1-6} .
53. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-44, en donde R^{4A} es metilo.
54. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-53, en donde R^{1A} es alquilo C_{1-4} .
55. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-53, en donde R^{1A} es


metilo.

56. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-55, en donde R^{2A} es alquilo C_{1-4} .


57. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-55, en donde R^{2A} es metilo.

58. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-57, en donde p es 2.


59. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es




60. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es





61. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es







62. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es






63. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es




64. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es






65. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es











66. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es




0




67. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es







68.El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es




0




,




,




,




,



,




0




.


69.El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es



,




70. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es



uno de los siguientes:

71. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde A^2 es



uno de los siguientes:

72. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es una cadena de hidrocarburos C_{1-60} bivalente, saturada o insaturada, lineal o ramificada, en donde 0-20 unidades de metileno del hidrocarburo se reemplazan independientemente con -O-, -S-, -N(H)-, -N(alquilo C_{1-6})-, -OC(O)-, -C(O)O-, -

S(O)-, -S(O)₂-, -N(H)S(O)₂-, -N(alquilo C₁₋₆)S(O)₂-, -S(O)₂N(H)-, -S(O)₂N(alquilo C₁₋₆)-, -N(H)C(O)-, -N(alquilo C₁₋₆)C(O)-, -C(O)N(H)-, -C(O)N(alquilo C₁₋₆)-, -OC(O)N(H)-, -OC(O)N(alquilo C₁₋₆)-, -N(H)C(O)O-, -N(alquilo C₁₋₆)C(O)O-, -N(carbociclilo de 3-10 miembros opcionalmente sustituido)-, carbociclilo de 3-10 miembros opcionalmente sustituido, o heterociclilo de 3-10 miembros opcionalmente sustituido que contiene 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre.


73. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es una cadena de hidrocarburos C₃₋₃₀ bivalente, saturada, lineal o ramificada, en donde 0-15 unidades de metileno del hidrocarburo se reemplazan independientemente con -O-, -N(H)-, -N(alquilo C₁₋₆)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -N(H)C(O)-, -N(alquilo C₁₋₆)C(O)-, -C(O)N(H)-, -C(O)N(alquilo C₁₋₆)-, carbociclilo de 3-10 miembros o heterociclilo de 3-10 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre.
74. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es una cadena de hidrocarburos C₃₋₃₀ bivalente, saturada, lineal o ramificada, en donde 0-15 unidades de metileno del hidrocarburo se reemplazan independientemente con -O-, -N(H)-, -N(alquilo C₁₋₆)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -N(H)C(O)-, -N(alquilo C₁₋₆)C(O)-, -C(O)N(H)- o -C(O)N(alquilo C₁₋₆)-.
75. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es una cadena de hidrocarburos C₅₋₄₀ bivalente, saturada o insaturada, lineal o ramificada, en donde 1-20 unidades de metileno del hidrocarburo se reemplazan independientemente con -O-, -N(H)-, -N(alquilo C₁₋₆)-, -N(H)C(O)-, -N(alquilo C₁₋₆)C(O)-, -C(O)N(H)-, -C(O)N(alquilo C₁₋₆)-, carbociclilo de 3-10 miembros opcionalmente sustituido, o heterociclilo de 3-10 miembros opcionalmente sustituido que contiene 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre.
76. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno)-X^{1-***}, en donde X¹ es alquileno C₀₋₄, alquinileno C₂₋₄ u O, en donde ***

es el punto de unión a A².

77. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 8-10 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno, en donde el anillo heterocíclico está sustituido por 0, 1 o 2 apariciones de halo o alquilo C₁₋₄)-X¹-***, en donde X¹ es alquileo C₀₋₄, alquinileo C₂₋₄ u O, en donde *** es el punto de unión a A².
78. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (anillo heterocíclico saturado espirocíclico de 10-13 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno)-X¹-***, en donde X¹ es alquileo C₀₋₄, alquinileo C₂₋₄ u O, en donde *** es el punto de unión a A².
79. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 76-78, en donde X¹ es alquileo C₁₋₄.
80. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 76-78, en donde X¹ es alquinileo C₂₋₄.
81. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 76-78, en donde X¹ es C≡C-.
82. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 76-78, en donde X¹ es O.
83. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (anillo heterocíclico saturado bicíclico, espirocíclico de 8-10 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno)-O-***, en donde *** es el punto de unión a A².
84. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es un anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno.
85. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (anillo heterocíclico saturado bicíclico fusionado de 8-10 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno, en donde el anillo heterocíclico está sustituido por 0, 1 o 2 apariciones de alquilo C₁₋₄)-.
86. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es -


(anillo heterocíclico saturado tricíclico de 9-13 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno)-(alquileo C_{0-4})-***, en donde *** es el punto de unión a A^2 .

87. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es un anillo aromático fusionado o parcialmente insaturado de 8-10 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno.
88. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es un anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-8 miembros que contiene 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno.
89. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (anillo heterocíclico saturado monocíclico de 3-7 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno)- X^3 -(anillo heterocíclico saturado monocíclico de 3-7 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno)-, en donde X^3 es alquileo C_{1-10} , -O-, -N(H)-, -N(alquilo C_{1-4})-, o un enlace.
90. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (piperidinileno)-(alquileo C_{1-5})-(piperazinileno)-***, en donde *** es el punto de unión a A^2 .
91. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es - (piperazinileno)-(azetidileno)-*** o -(azetidileno)-(piperazinileno)-***, en donde *** es el punto de unión a A^2 .
92. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es uno de los siguientes:



en donde *** es el punto de unión a A².


93. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71, en donde L es uno de los siguientes:




en donde *** es

el punto de unión a A².


94. Un compuesto representado por la Fórmula It, Iu, Ivo Iw, o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




(It)



(Iu)



(Iv)



(Iw)

en donde

L es uno de los siguientes:


- (i) -(anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno)-O-***, en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula;
- (ii) un anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno; o
- (iii) -(anillo heterocíclico saturado espirocíclico de 7-11 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno)-(alquilileno C₂₋₄)-***, en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula;

y


t es 0 o 1.

95. El compuesto de la reivindicación 94, en donde t es 0.


96. Un compuesto representado por la Fórmula Ix, Iy, Iz o Iaa, o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




(Ix)



(Iy)



(Iz)



(Iaa)

en donde:

R²⁰ es metilo, etilo, -CH₂-O-CH₃, o -(CH₂)₂-O-CH₃;

L es uno de los siguientes:

(i) -(anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno)-O-***, en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula;

(ii) un anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno; o

(iii) -(anillo heterocíclico saturado espirocíclico de 7-11 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno)-(alquinileno C₂₋₄)-***, en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula;


y

t es 0 o 1.

97. El compuesto de la reivindicación 96, en donde t es 0.
98. El compuesto de la reivindicación 96 o 97, en donde R²⁰ es metilo o etilo.
99. El compuesto de la reivindicación 96 o 97, en donde R²⁰ es -CH₂-O-CH₃ o -(CH₂)₂-O-CH₃.
100. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 94-99, en donde L es un -(anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno)-O-***, en donde *** es el punto


de unión al grupo fenileno en dicha fórmula.

101. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 94-99, en donde L es un anillo heterocíclico saturado espirocíclico o bicíclico fusionado de 7-11 miembros que contiene 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno.
102. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 94-99, en donde L es -(anillo heterocíclico saturado espirocíclico de 7-11 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno)-(alquínico C₂₋₄)-***, en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula.
103. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 94-99, en donde L es uno de los siguientes:



en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula.

104. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71 o 94-99, en


donde L es , en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula.

105. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-71 o 94-99, en


donde L es , en donde *** es el punto de unión al grupo fenileno en dicha fórmula.

106. El compuesto de la reivindicación 94, en donde el compuesto está representado por la Fórmula lab o una sal farmacéuticamente aceptable de


esta:




107. El compuesto de la reivindicación 94, en donde el compuesto está representado por la Fórmula lac o una sal farmacéuticamente aceptable de esta:




108. El compuesto de la reivindicación 94, en donde el compuesto está representado por la Fórmula lad o una sal farmacéuticamente aceptable de esta:




109. El compuesto de la reivindicación 94, en donde el compuesto está representado por la Fórmula lae o una sal farmacéuticamente aceptable de esta:




110. El compuesto de la reivindicación 94, en donde el compuesto está representado por la Fórmula laf o una sal farmacéuticamente aceptable de esta:



111. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula lag o una sal farmacéuticamente aceptable de esta:



112. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula lah o una sal farmacéuticamente aceptable de esta:




113. Un compuesto en la Tabla 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

114. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-113 o un portador farmacéuticamente

aceptable.

115. Un método para tratar el cáncer, que comprende administrar a un paciente que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 113 para tratar el cáncer.
116. El método de la reivindicación 115, en donde el cáncer es cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer de mama, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, cáncer bucal, cáncer de esófago, cáncer de vías respiratorias y digestivas altas, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de piel, carcinoma de glándulas sebáceas, cáncer de vías biliares, cáncer de vesícula biliar, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de vías urinarias, cáncer de riñón, cáncer de ojo, cáncer de tiroides, linfoma o leucemia.
117. El método de la reivindicación 115, en donde el cáncer es cáncer de próstata.
118. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 115-117, en donde el paciente es un ser humano.
119. Un método para provocar la muerte de una célula cancerosa, que comprende poner en contacto una célula cancerosa con una cantidad eficaz de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-113 para provocar la muerte de la célula cancerosa.
120. El método de la reivindicación 119, en donde la célula cancerosa se selecciona de una célula de cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer de mama, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, cáncer bucal, cáncer de esófago, cáncer de vías respiratorias y digestivas altas, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de piel, carcinoma de glándulas sebáceas, cáncer de vías biliares, cáncer de vesícula biliar, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de vías urinarias, cáncer de riñón, cáncer de ojo, cáncer de tiroides, linfoma o leucemia.
121. El método de la reivindicación 119, en donde la célula cancerosa es célula de cáncer de próstata.

122. Un compuesto cristalino de la Fórmula II-5:



123. El compuesto de la reivindicación 122, en donde el compuesto exhibe un patrón de difracción de polvo de rayos X que comprende picos en los siguientes ángulos de difracción (2θ): $13,1 \pm 0,2$, $17,6 \pm 0,2$, $18,3 \pm 0,2$, $18,7 \pm 0,2$, $19,5 \pm 0,2$, $23,8 \pm 0,2$, y $25,6 \pm 0,2$.
124. El compuesto de la reivindicación 123, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en el siguiente ángulo de difracción (2θ): $8,1 \pm 0,2$.
125. El compuesto de la reivindicación 123 o 124, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en el siguiente ángulo de difracción (2θ): $9,9 \pm 0,2$.
126. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 123-125, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en el siguiente ángulo de difracción (2θ): $10,5 \pm 0,2$.
127. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 123-126, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en el siguiente ángulo de difracción (2θ): $15,8 \pm 0,2$.
128. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 123-127, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en el siguiente ángulo de difracción (2θ): $19,8 \pm 0,2$.
129. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 123-128, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en el siguiente ángulo de difracción (2θ): $25,3 \pm 0,2$.
130. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 123-129, en donde

la intensidad relativa del pico en dichos ángulos de difracción (2θ) es al menos 20 %.

131. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 123-129, en donde la intensidad relativa del pico en dichos ángulos de difracción (2θ) es al menos 30 %.
132. El compuesto de la reivindicación 122, el compuesto se caracteriza por el siguiente patrón de difracción de polvo de rayos X expresado en términos de ángulo de difracción 2θ , distancias interplanares de intensidad relativa (expresada como un porcentaje con respecto al pico más intenso):

Ángulo [2θ]	espaciado-d [Å]	Intensidad relativa (%)
8,1	11,0	28
8,3	10,6	13
8,6	10,2	22
9,5	9,3	8
9,9	8,9	34
10,5	8,4	31
11,7	7,6	9
12,1	7,3	8
13,1	6,8	81
13,5	6,5	9
15,5	5,7	10
15,8	5,6	28
16,1	5,5	14
16,6	5,3	9
17,6	5,0	39
18,0	4,9	14
18,3	4,9	38
18,7	4,7	37
19,5	4,5	100

Ángulo [2θ]	espaciado-d [Å]	Intensidad relativa (%)
19,8	4,5	37
20,4	4,4	11
21,6	4,1	22
22,7	3,9	5
23,3	3,8	9
23,5	3,8	21
23,8	3,7	56
24,3	3,7	22
25,1	3,5	20
25,3	3,5	30
25,6	3,5	64
26,2	3,4	7
27,0	3,3	6
27,5	3,2	7
28,8	3,1	6
31,9	2,8	6
33,1	2,7	5
33,7	2,7	8

133. El compuesto de la reivindicación 122, en donde el compuesto tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo sustancialmente como se muestra en la Figura 1.
134. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-133, en donde el compuesto tiene un punto de fusión inicial, determinado mediante calorimetría diferencial de barrido en el rango de aproximadamente 180 grados Celsius a aproximadamente 200 grados Celsius.
135. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-133, en donde el compuesto presenta un punto de fusión inicial, determinado mediante

- calorimetría diferencial de barrido de aproximadamente 192 grados Celsius.
136. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-133, en donde el compuesto tiene una curva de calorimetría diferencial de barrido sustancialmente igual a la que se muestra en la Figura 2.
137. El compuesto de la reivindicación 122, en donde el compuesto exhibe un patrón de difracción de polvo de rayos X que comprende picos en los siguientes ángulos de difracción (2θ): $9,4 \pm 0,2$, $12,8 \pm 0,2$, $15,4 \pm 0,2$, $18,2 \pm 0,2$, $18,7 \pm 0,2$, $20,2 \pm 0,2$, y $24,6 \pm 0,2$.
138. El compuesto de la reivindicación 137, en donde el patrón de difracción de polvo de rayos X comprende además un pico en uno o más de los siguientes ángulos de difracción (2θ): $8,5 \pm 0,2$, $11,7 \pm 0,2$, $12,5 \pm 0,2$, $17,6 \pm 0,2$, $19,6 \pm 0,2$, $21,9 \pm 0,2$, y $23,5 \pm 0,2$.
139. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 137 o 138, en donde la intensidad relativa del pico en dichos ángulos de difracción (2θ) es al menos 20 %.
140. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 137 o 138, en donde la intensidad relativa del pico en dichos ángulos de difracción (2θ) es al menos 30 %.
141. El compuesto de la reivindicación 122, el compuesto se caracteriza por el siguiente patrón de difracción de polvo de rayos X expresado en términos de ángulo de difracción 2θ , distancias interplanares de intensidad relativa (expresada como un porcentaje con respecto al pico más intenso):

Ángulo [2θ]	espaciado-d [Å]	Intensidad relativa (%)
5,9	15,0	19
8,0	11,0	10
8,5	10,3	47
9,1	9,7	24
9,4	9,4	61
11,7	7,5	34

Ángulo [2θ]	espaciado-d [Å]	Intensidad relativa (%)
12,5	7,1	32
12,8	6,9	50
14,5	6,1	6
14,8	6,0	9
15,4	5,8	100
15,9	5,6	6
17,1	5,2	15
17,6	5,0	44
18,2	4,9	57
18,7	4,7	85
19,6	4,5	36
20,2	4,4	91
20,8	4,3	11
21,0	4,2	12
21,4	4,2	10
21,9	4,1	38
22,3	4,0	22
22,9	3,9	10
23,5	3,8	34
23,9	3,7	20
24,6	3,6	74
25,1	3,5	21
25,4	3,5	5
26,1	3,4	23
26,5	3,4	5
27,1	3,3	22
27,4	3,3	5
28,7	3,1	14

Ángulo [2θ]	espaciado-d [Å]	Intensidad relativa (%)
29,8	3,0	11
31,0	2,9	6
32,4	2,8	7

142. El compuesto de la reivindicación 122, en donde el compuesto tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo sustancialmente como se muestra en la Figura 4.
143. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 137-142, en donde el compuesto tiene un punto de fusión inicial, determinado mediante calorimetría diferencial de barrido en el rango de aproximadamente 180 grados Celsius a aproximadamente 200 grados Celsius.
144. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 137-142, en donde el compuesto presenta un punto de fusión inicial, determinado mediante calorimetría diferencial de barrido de aproximadamente 192 grados Celsius.
145. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 137-142, en donde el compuesto tiene una curva de calorimetría diferencial de barrido sustancialmente igual a la que se muestra en la Figura 5.
146. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-145, en donde el compuesto tiene una pureza superior al 98 % en peso.
147. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-145, en donde el compuesto tiene una pureza superior al 99 % en peso.
148. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-145, en donde el compuesto tiene una pureza superior al 99,5 % en peso.
149. Un compuesto en la Tabla 3, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.
150. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-149 o un portador farmacéuticamente aceptable.
151. Un método para tratar el cáncer, que comprende administrar a un paciente que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de

una cualquiera de las reivindicaciones 122-149 para tratar el cáncer.

152. El método de la reivindicación 151, en donde el cáncer es cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer de mama, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, cáncer bucal, cáncer de esófago, cáncer de vías respiratorias y digestivas altas, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de piel, carcinoma de glándulas sebáceas, cáncer de vías biliares, cáncer de vesícula biliar, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de vías urinarias, cáncer de riñón, cáncer de ojo, cáncer de tiroides, linfoma o leucemia.
153. El método de la reivindicación 151, en donde el cáncer es cáncer de próstata.
154. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 151-153, en donde el paciente es un ser humano.
155. Un método para provocar la muerte de una célula cancerosa, que comprende poner en contacto una célula cancerosa con una cantidad eficaz de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 122-149 para provocar la muerte de la célula cancerosa.
156. El método de la reivindicación 155, en donde la célula cancerosa se selecciona de una célula de cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer de mama, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, cáncer bucal, cáncer de esófago, cáncer de vías respiratorias y digestivas altas, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de piel, carcinoma de glándulas sebáceas, cáncer de vías biliares, cáncer de vesícula biliar, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de vías urinarias, cáncer de riñón, cáncer de ojo, cáncer de tiroides, linfoma o leucemia.
157. El método de la reivindicación 155, en donde la célula cancerosa es una célula de cáncer de próstata.