




**FIG. 1A**

**FIG. 1B**

**FIG. 1C**




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



	N.º de Registro	Dx (10) (µm)	Dx (50) (µm)	Dx (90) (µm)	D [4,3] (µm)	Oscurecimiento del láser (%)
	1	2.95	7.15	23.9	20.9	12.47
	2	2.93	6.67	19.5	13.9	12.83
	3	2.93	6.51	17.6	10.1	13.00
Media		2.94	6.78	20.3	15.01	12.76
1xDesv Est		0.0139	0.335	3.26	5.47	0.27
1xRSD (%)		0.472	4.94	16.0	36.6	2.13

FIG. 5




FIG. 6A




FIG. 6B




FIG. 7




FIG. 8



FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11






FIG. 12

**FIG. 13**

**FIG. 14**








FIG. 15

**FIG. 16**

**FIG. 17**

**FIG. 18**

**FIG. 19**




FIG. 20





FIG. 21

**FIG. 22**




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32





FIG. 33



Ruta	Condiciones experimentales	Forma cristalina
1	Suspensión en EtOH o MeOH a TA	Forma B (torta húmeda); monometanolato o monoetanolato
2	Secado en condiciones ambientales	Forma A (sólidos secos); monohidrato
3	Suspensión en MeCN en presencia de semillas de Forma C a TA	Forma C (torta húmeda); muy probablemente solvato de MeCN metaestable que se convierte en monohidrato
4	Sistema MeCN/agua (aw= 0.0-0.6) en presencia de semillas de Forma C a TA	Forma C (torta húmeda); muy probablemente solvato de MeCN metaestable que se convierte en monohidrato
5	Agua a TA	Forma A (sólidos secos); monohidrato
6	(95/5 v/v) EtOH/agua a TA	Forma A (sólidos secos); monohidrato

FIG. 34