

REIVINDICACIONES

1. Una combinación herbicida que comprende:
 - a. asulam; y
 - b. al menos un segundo herbicida seleccionado de la clase de herbicidas de triazolona, N-feniltriazolinona, isoxazolidinona y ariloxifenoxipropiónicos.
2. La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de triazolona es amicarbazona.
3. La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de N-feniltriazolinona se selecciona entre azafenidina, bencarbazona, carfentrazona o sulfentrazona.
4. La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de isoxazolidinona se selecciona entre bixlozona, broclozona o clomazona.
5. La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida ariloxifenoxipropiónico se selecciona entre clorazifop, clodinafop, clofop, cihalofof, diclofop, difenopenteno, fenoxaprop, fenoxaprop-P, fentiaprop, fluazifop, fluazifop-P, haloxifop, haloxifop-P, isoxapirifop, kuicaoxi, metamifop, propaquizafop, quizalofop, quizalofop-P, trifop o trifopsima.
6. La combinación herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el asulam y el segundo herbicida se combinan en una relación en el intervalo entre 1:100 y 100:1.

7. Una composición herbicida que comprende:
 - a. asulam;
 - b. al menos un segundo herbicida seleccionado de la clase de herbicidas de triazolona, N-feniltriazolinona, isoxazolidinona y ariloxifenoxipropiónicos; y
 - c. al menos un excipiente agrícolamente aceptable.
8. Un método para controlar las malas hierbas aplicando una cantidad eficaz de una combinación o composición herbicida que comprende asulam y al menos un segundo herbicida seleccionado de la clase de herbicidas de triazolona, N-feniltriazolinona, isoxazolidinona y ariloxifenoxipropiónicos.
9. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el asulam se aplica a una dosis en el intervalo de aproximadamente 1000 a aproximadamente 8000 g p.a./ha.
10. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el segundo herbicida se aplica a una dosis de aproximadamente 10 a aproximadamente 3000 g p.a./ha.